



# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<i>Глава 16.</i> Альдегиды и кетоны .....	6
<i>Глава 17.</i> Енолы и енолят-ионы .....	86
<i>Глава 18.</i> Карбоновые кислоты и их производные .....	166
<i>Глава 19.</i> Амины .....	273
<i>Глава 20.</i> Ароматические и алифатические нитросоединения, диазосоединения и азиды .....	325
<i>Глава 21.</i> Фенолы и хиноны .....	408
<i>Глава 22.</i> Циклоалканы .....	475


# Глава 16

## АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ

16.1. Номенклатура альдегидов и кетонов .....	8
16.2. Получение карбонильных соединений .....	12
16.2.1. Получение альдегидов .....	12
16.2.1.а. Окисление первичных спиртов .....	12
16.2.1.б. Озонолиз алканов .....	12
16.2.1.в. Восстановление производных карбоновых кислот .....	13
16.2.1.г. Получение альдегидов гидроборированием — окислением алкинов-1 .....	14
16.2.1.д. Гидроформилирование алканов (оксосинтез) .....	14
16.2.2. Получение ароматических альдегидов .....	16
16.2.2.а. Окисление ароматических метилпроизводных .....	16
16.2.2.б. Ароматические альдегиды из галогенметиларилпроизводных .....	17
16.2.2.в. Окисление бензилгалогенидов в ароматические альдегиды с помощью солей 2-нитропропана .....	18
16.2.2.г. Получение альдегидов из производных ароматических карбоновых кислот .....	19
16.2.3. Получение кетонов .....	20
16.2.3.а. Окисление вторичных спиртов .....	20
16.2.3.б. Гидратация алканов по Кучерову .....	20
16.2.3.в. Гидроборирование — окисление нетерминальных алканов .....	20
16.2.3.г. Ацилирование металлоорганических соединений .....	20
16.3. Реакции карбонильных соединений .....	23
16.3.1. Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе альдегидов и кетонов .....	23
16.3.1.а. Гидратация карбонильных соединений .....	27
16.3.1.б. Образование ацеталей и кеталей при присоединении спиртов .....	29
16.3.1.в. Тиоацетали и тиокетали .....	33
16.3.1.г. Присоединение цианистого водорода .....	37
16.3.1.д. Присоединение гидросульфита натрия .....	39
16.3.1.е. Реакции с металлоорганическими соединениями. Диастереомерные переходные состояния в реакциях нуклеофильного присоединения к карбонильной группе ..	40
16.3.1.ж. Присоединение первичных и вторичных аминов. Получение иминов и енаминов .....	44
16.3.2. Реакция Виттига .....	49
16.3.3. Образование оксиранов при взаимодействии карбонильных соединений с илидами серы .....	57
16.3.4. Сопряженное присоединение к $\alpha,\beta$ -ненасыщенным альдегидам и кетонам .....	59
16.3.4.а. Сопряженное присоединение аминов .....	60
16.3.4.б. Сопряженное присоединение цианистого водорода .....	61
16.3.4.в. Присоединение металлоорганических соединений .....	62
16.3.4.г. Сопряженное присоединение борорганических соединений ..	64
16.3.5. Восстановление $\alpha,\beta$ -ненасыщенных альдегидов и кетонов .....	65

16.3.6. Восстановление альдегидов и кетонов .....	69
16.3.7. Окисление альдегидов и кетонов .....	75
16.3.7.а. Окисление кетонов до сложных эфиров (реакция Байера—Виллигера) .....	77
16.3.7.б. Аутоокисление альдегидов .....	79
16.3.8. Реакция Каннишцаро .....	82
16.3.9. Декарбонилирование альдегидов .....	84

Альдегиды и кетоны содержат карбонильную группу  $\text{C}=\text{O}$ . Соединения, в которых карбонильная группа соединена с двумя радикалами, называются кетонами. Соединения, где карбонильная группа соединена с одним радикалом и одним атомом водорода, называются альдегидами.




альдегид



кетон

Ниже приведена структура простейшего альдегида — формальдегида с данными валентных углов и длин связей.




длина связи,  $\text{\AA}$   
 $\text{C}=\text{O}$  1,203  
 $\text{C—H}$  1,101

валентный угол, град  
 $\text{H—C=O}$  121,8  
 $\text{H—C—H}$  116,5

Наличие валентных углов, близких к  $120^\circ$ , и планарность альдегидной группы  $\text{CHO}$  определенно указывают на  $sp^2$ -гибридизацию карбонильного углерода. В формальдегиде атом углерода образует  $\sigma$ -связи с двумя атомами водорода и кислородом.  $\pi$ -Связь в карбонильной группе возникает в результате перекрывания не участвующей в гибридизации  $p_z$ -орбитали углерода и  $p_z$ -орбитали кислорода. У кислорода в альдегидах и кетонах, а также карбоновых кислотах и их производных имеются две несвязывающие пары электронов. Кислород обладает более высокой электроотрицательностью, чем углерод, а электроны  $\sigma$ - и, особенно,  $\pi$ -связи углерода и кислорода сильно смещены к атому кислорода. Другими словами, карбонильная группа обладает высокой полярностью. Химическим следствием полярности карбонильной группы являются разнообразные реакции присоединения различных полярных реагентов по карбонильной группе.

Неподеленные пары электронов карбонильного кислорода придают карбонильной группе свойства слабого основания Льюиса.


Альдегиды и кетоны в кислой среде протонируются с образованием оксониевого катиона:




Карбонильные соединения относятся к числу очень слабых оснований, намного более слабых, чем вода и спирты. Так, например, ацетон оказывается наполовину протонированным только в 82%-й водной серной кислоте, т.е. в сильнокислом растворе. Это соответствует значению  $\text{p}K_a = -7,2$  для сопряженной кислоты ацетона  $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}^{\oplus}$ . Для сравнения напомним, что  $\text{p}K_a$  кationa  $\text{H}_3\text{O}^{\oplus}$  равно  $-1,7$ , т.е. сопряженные карбонильным соединениям кислоты проявляют свойства очень сильных кислот. Тем не менее, слабые основные свойства карбонильной группы играют исключительно важную роль в интерпретации химических свойств альдегидов и кетонов.

## 16.1. НОМЕНКЛАТУРА АЛЬДЕГИДОВ И КЕТОНОВ


Тривиальные названия альдегидов происходят от названия карбоновых кислот с тем же числом атомов углерода (табл. 16.1). В этой номенклатуре заместители обозначаются греческими буквами  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  и т.д., начиная с углеродного атома, ближайшего к карбонильному углероду:





Кетоны имеют тривиальные названия, включающие суффикс «кетон» и названия обоих алкильных радикалов:




Для обозначения заместителей в этой номенклатуре также используются буквы греческого алфавита:



Согласно номенклатуре ИЮПАК, названия альдегидов происходят от названия алканов с добавлением окончания «аль» (см. табл. 16.1). Так как альдегидная группа  $\text{CHO}$  всегда находится на конце цепи, нет необходимости в специальном обозначении положения этой группы, но карбонильный атом углерода всегда имеет первый номер:




В более сложных случаях альдегид называют, используя окончание «карбальдегид»:




2, 3-диметилцикlopентанкарбальдегид

Однако в таких случаях проще всего называть альдегидную группу формильной группой:




2-формилциклогексанон

Таблица 16.1


Название	Тривиальное название	Формула	Температура плавления, °C	Температура кипения, °C	Плотность, г/мл
1	2	3	4	5	6
<b>Альдегиды</b>					
Метаналь	формальдегид	HCHO	-93	-21	0,82 при -20°C
Этаналь	ацетальдегид	CH <sub>3</sub> CHO	-123	21	0,78
Пропаналь	пропионовый	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CHO	-81	49	0,81
Бутаналь	масляный	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CHO	-99	76	0,82
2-Метил-пропаналь	изомасляный	CH <sub>3</sub>   CH-CHO   CH <sub>3</sub>	-66	61	0,79
Пентаналь	валериановый	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CHO	-91	103	0,82
Гексаналь	капроновый	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CHO	-57	131	0,83
Гептаналь	энантовый	CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> CHO	-45	155	0,85
Бензальдегид	бензальдегид	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHO	-56	179	1,05
Фенилэтаналь	фенил-уксусный	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> CHO	-33	193	—
Пропеналь	акролеин	CH <sub>2</sub> =CHCHO	-88	53	0,84
2-Бутеналь	кротоновый	CH <sub>3</sub> CH=CHCHO	-77	104	0,86
2-Гидрокси-бензальдегид	салициловый	o-HOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CHO	2	197	1,16
<i>n</i> -Метил-бензальдегид	<i>n</i> -толуиловый	<i>n</i> -CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CHO	—	205	1,02
<i>o</i> -Метил-бензальдегид	<i>o</i> -толуиловый	<i>o</i> -CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CHO	—	196	1,04
<i>m</i> -Метил-бензальдегид	<i>m</i> -толуиловый	<i>m</i> -CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> CHO	—	199	1,02
3-Метокси-4-гидроксибензальдегид	ванилин		82	285	—
<b>Кетоны</b>					
Пропанон	ацетон	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	-95	56	0,79
Бутанон	метилэтил-кетон	CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-86	80	0,80
Пентанон-2	метилпропил-кетон	CH <sub>3</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-78	102	0,81
Пентанон-3	диэтилкетон	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-42	102	0,81
Гексанон-2	метилбутил-кетон	CH <sub>3</sub> CO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	-57	127	0,83
Гексанон-3	этилпропил-кетон	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	—	124	0,82
Гептанон-2	метилпентил-кетон	CH <sub>3</sub> CO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH <sub>3</sub>	-36	151	0,82

1	2	3	4	5	6
Гептанон-3	этилбутил-кетон	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	-39	148	0,82
Гептанон-4	дипропил-кетон	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COC}_3\text{H}_7$	-33	144	0,82
Цикло-пентанон		цикло- $\text{C}_4\text{H}_8\text{CO}$	-58	130	0,95
Цикло-гексанон		цикло- $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{CO}$	-45	157	0,94
Ацетофенон	метилфенил-кетон	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$	21	202	1,02
Пропиофенон	этилфенил-кетон	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{CH}_3$	21	218	1,01
Бензофенон	дифенилкетон	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_6\text{H}_5$	48	305	
Бутен-3-он-2	метилвинил-кетон	$\text{CH}_3\text{COCH}=\text{CH}_2$	-6	80	0,86
4-Метил-пентен-3-он-2	окись мезитила	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCOCH}_3$	-59	131	0,86
Бутирофенон	пропил-фенилкетон	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COC}_3\text{H}_7$	11	232	0,99

Для кетонов номенклатура ИЮПАК использует окончание «он», прибавляемое к названию соответствующего алкана. Наиболее длинную цепь ациклических кетонов выбирают таким образом, чтобы она обязательно включала карбонильную группу, и ее нумерация производится как обычно таким образом, чтобы карбонильный углерод получил наименьший номер. В циклических кетонах карбонильный углерод определяет начало нумерации:




## 2-хлор-4-метилцикlopентанон



### 5-этилоктанон-3

Если в молекуле кетона имеется другая, более старшая функциональная группа —  $\text{CHO}$ ,  $\text{COOH}$ , для обозначения кетогруппы

используется префикс «оксо» с номером, соответствующим положению карбонильного углерода кетонной группы:



Желательно избегать смешения двух различных номенклатур — обычной и ИЮПАК.




## 16.2. ПОЛУЧЕНИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Существует большое число разнообразных методов получения карбонильных соединений. Некоторые из них были подробно описаны ранее в других главах. Здесь приводится только краткая сводка основных методов получения альдегидов и кетонов. Более подробно эти реакции рассматриваются в других главах.

### 16.2.1. ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬДЕГИДОВ

#### 16.2.1.а. ОКИСЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СПИРТОВ


Эта реакция была подробно описана в гл. 11, поэтому здесь приведены только отдельные примеры:




#### 16.2.1.б. ОЗОНОЛИЗ АЛКЕНОВ

Озонолиз симметричных дизамещенных алkenов с последующим восстановительным расщеплением озонидов является общим методом получения альдегидов (гл. 5). Для несимметричных дизамещенных алkenов, также как для тетразамещенных производных с помощью озонолиза получаются кетоны. Если озо-

нолизу подвергается циклический алken, образуется дикарбонильное соединение, например:







В настоящее время с озонолизом успешно конкурирует окислительная деструкция алkenов под действием смеси  $OsO_4$  и  $NaIO_4$  (гл. 5):




#### 16.2.1.в. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Целый ряд функциональных производных карбоновых кислот — галогенангидриды, сложные эфиры, нитрилы, диалкиламиды могут быть в одну стадию превращены в альдегиды при действии специфических восстановителей. Подробное описание этих реакций будет проведено в гл. 18 (ч. 3), посвященной свойствам производных карбоновых кислот. Здесь приведены только некоторые наиболее типичные примеры:






### 16.2.1.г. ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬДЕГИДОВ ГИДРОБОРИРОВАНИЕМ – ОКИСЛЕНИЕМ АЛКИНОВ-1




Этот универсальный метод описан ранее в гл. 7. По своей методологии к нему примыкает способ, основанный на гидросилировании терминальных алкинов с последующим окислением и кислотным расщеплением оксиранового цикла:



### 16.2.1.д. ГИДРОФОРМИЛИРОВАНИЕ АЛКЕНОВ (ОКСОСИНТЕЗ)

Этот метод получения альдегидов используется исключительно в промышленности. Алкены при обработке окисью углерода и водородом под давлением при повышенной температуре в присутствии октакарбонилдикобальта или других гомогенных металлокомплексных катализаторов образуют альдегиды. Решающий успех в оксо-синтезе был достигнут благодаря использованию металлокомплексного катализа. Фактически это был первый пример

гомогенного металлокомплексного катализа в органической химии, который сразу же приобрел важное значение для химической технологии (гл. 28, ч. 4):



Количество изомерного разветвленного альдегида можно свести к минимуму, если в качестве катализатора в гораздо более мягких условиях использовать гомогенные комплексы Pt(II) с органическими лигандами или более эффективный гидрохлорид дицикlopентадиенилциркония  $(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{ZrHCl}$ :



Основным современным промышленным методом получения уксусного альдегида является катализическое окисление этилена, получаемого в огромном количестве при крекинге углеводородов. Этилен окисляют в водном растворе, содержащем хлориды палладия (II) и меди (II) (так называемый «Вакер-процесс»). Катализатор регенерируют при действии кислорода в условиях непрерывного синтеза:



Этот процесс имеет гораздо большее значение, чем гидратация ацетилена по реакции Кучерова или дегидрирование этанола на хромите меди или металлической меди.

Формальдегид получают в промышленности каталитическим дегидрированием метанола:



Эта реакция эндотермична, и для поддержания требуемого температурного режима выделяющийся водород сжигают.

Чем привлекает органическая химия? Одних она увлекает дедуктивной логикой и теоретическими концепциями, касающимися механизмов реакции и реакционной способности органических молекул. Другие видят здесь возможность воплотить свои «алхимические» мечты о получении неизвестных молекул, причем не только в ответ на практические запросы. Органический синтез открывает пути к получению сложных молекул, соответствующих требованиям химической эстетики.

Из предисловия. Часть 1

Именно синтез молекул делает науку химию очень близкой к искусству... Я убежден, что созидательная способность исключительно сильна в химии... В этом смысле работа химика-синтетика весьма схожа с работой инженера-конструктора.

Р. Хоффман, В. Торренс  
(*Chemistry Imagined. Reflections on Sciences*,  
Smithsonian Institution Press, Washington, 1993)